

FICHA TÉCNICA MAXFORCE® PRIME

Marca Comercial: Maxforce® Prime

Nome Técnico: Imidacloprido

Grupo Químico: Neonicotinóide

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0040

N.º C.A.S.: 138261-41-3

Formulação: Gel

Concentração de i.a.: Imidacloprido 2,15% p/p

Inertes: Atrativos, estabilizantes, espessantes, dispersantes, conservantes, desnaturante, antiespumante, solventes, umectante 97,85 % p/p

Denominação Química: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Fórmula Bruta: C₉H₁₀ClN₅O₂

Dados Toxicológicos: DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 5000 mg/kg;

Classe: inseticida

Embalagem/Apresentação: Display contendo 04 seringas de 30g cada; Caixa de embarque contendo 12 displays com 4 seringas de 30 g.

Indicação de Uso

Maxforce® PRIME é indicado para áreas sensíveis onde não é possível a aplicação de inseticidas convencionais, como por exemplo, equipamentos elétricos e eletrônicos etc.

Deve ser aplicado nos seguintes locais:

- ✓ Fendas e frestas em paredes;
- ✓ Atrás e debaixo de eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar, forno de microondas, etc.);
- ✓ Embaixo de pias e balcões;
- ✓ Dentro e atrás de armários;
- ✓ Embaixo de bancos e poltronas de trens, metrô e outros maquinários;
- ✓ Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármore devido ao risco de ocorrerem manchas.



Locais de Aplicação

Maxforce® PRIME é indicado para ser utilizado em: indústrias de alimentos, residências, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrô, empresas de ônibus, aeroportos, hotéis, etc.

Maxforce® Prime não deve ser aplicado em áreas sujeitas a lavagens frequentes ou recentemente tratadas com outros inseticidas.

Sempre usar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.

Reavaliar as áreas tratadas e verificar a necessidade de um tratamento adicional.

Deve-se aplicar a isca mensalmente ou enquanto persistirem as infestações.

Tempo de reentrada

Em decorrência da natureza não volátil de Imidacloprido e da formulação gel, pode-se considerar que a exposição inalatória não ocorrerá com Maxforce® prime. Portanto, não é estabelecido tempo de reentrada após aplicação do produto.

Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória ao aplicar o produto.

Doses e recomendações de uso

Espécie de baratas	Dose Indicada
<i>Blattella germanica</i>	0,25g/m ²
<i>Periplaneta americana</i>	

Recomenda-se a distribuição da dose de 0,25g/m² em várias gotas.

Bayer CropScience



Indicação para uso médico:

Antídoto/ Tratamento: Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450

Observação:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO